

CLDEQ Оценяване на въпросника за комфорта с контактни лещи

Процедура за оценяване

1 Стъпка	Кодирайте с нула въпросите за интензивност, когато отговора е „Никога“. В противен случай точки 1-5 остават.
2 Стъпка	Изчислете средната интензивност за всеки от 9 -те симптома **.
3 Стъпка	Определете всеки симптом по табелата по-долу

A	Комфорт с контактните лещи (въпрос 1)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,03
	Сухота (въпрос 2)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,18
	Замъглено/неясно зрение (въпрос 3)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,01
	Раздразнение (въпрос 4)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,02
	Пясък в очите (въпрос 5)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,07
	Чуждо тяло (въпрос 6)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,09
B	Парене (въпрос 7)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,07
	Светлочувствителност (въпрос 8)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,09
	Сърбеж (въпрос 9)	=	отговор* средна аритметична интензивност	0,10

Стъпка 4	Съберете точките от първите 6 симптома (Сумата A) Съберете точките от последните 3 симптома (Сумата B)
Стъпка 5	Изчисления резултат = Сумата от A – Сумата B

- Когато клиента/пациента е на мнение, че има сухи очи и изчисления резултат е $> 0,13$, то тогава диагностицираме сухо око
- Когато клиента/пациента е на мнение, че няма сухи очи и изчисления резултат е $> 1,27$ то тогава диагностицираме сухо око
- Когато клиента/пациента е несигурен даки има сухи очи и изчисления резултат е $> 1,44$ то тогава диагностицираме сухо око

** Точките не могат да се изчислят по посочения начин ако не са отговорени **всички** въпроси за интензивност,